


# Bulletin 33/15

Office fédéral de la santé publique



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI  
Office fédéral de la santé publique OFSP



**Editeur**

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne  
[www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

**Rédaction**

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne  
Téléphone 058 463 87 79  
[drucksachen-bulletin@bag.admin.ch](mailto:drucksachen-bulletin@bag.admin.ch)

**Impression**

ea Druck AG  
Zürichstrasse 57  
CH-8840 Einsiedeln  
Téléphone 055 418 82 82

**Abonnements, changements d'adresse**

OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne  
Téléphone 058 465 50 50  
Fax 058 465 50 58  
[verkauf.zivil@bbl.admin.ch](mailto:verkauf.zivil@bbl.admin.ch)

ISSN 1420-4274

---

Sommaire	
Maladies transmissibles	
<b>Déclarations des maladies infectieuses</b>	616
<b>Situation actuelle: nombre de consultations médicales suite à une piqûre de tique, nombre de cas de borréliose de Lyme et de cas de FSME</b>	618
<b>Statistique Sentinella</b>	620
Assurance maladie et accidents	
<b>Liste des spécialités</b>	621

## Déclarations des maladies infectieuses

Situation à la fin de la 31<sup>e</sup> semaine (04.08.2015)<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en *italique* correspondent aux données annualisées: cas/an et 100000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

<sup>b</sup> Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella: [www.bag.admin.ch/sentinella](http://www.bag.admin.ch/sentinella).

<sup>c</sup> N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

<sup>d</sup> Femmes enceintes et nouveau-nés.

<sup>e</sup> Inclus les cas de diphtérie cutanée et respiratoire, actuellement il y a seulement des cas de diphtérie cutanée.

	Semaine 31			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013	2015	2014	2013	2015	2014	2013
Transmission respiratoire												
Haemophilus influenzae: maladie invasive			2	5	1	6	106	89	91	72	66	59
			<i>1.30</i>	<i>0.80</i>	<i>0.20</i>	<i>1.00</i>	<i>1.30</i>	<i>1.10</i>	<i>1.10</i>	<i>1.50</i>	<i>1.40</i>	<i>1.20</i>
Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers <sup>b</sup>	1	1		3	10		5801	1535	2878	5736	1514	2822
	<i>0.60</i>	<i>0.60</i>		<i>0.50</i>	<i>1.60</i>		<i>71.00</i>	<i>18.80</i>	<i>35.20</i>	<i>117.70</i>	<i>31.10</i>	<i>57.90</i>
Légionellose	7	6	7	32	42	30	346	282	305	195	144	149
	<i>4.40</i>	<i>3.80</i>	<i>4.40</i>	<i>5.10</i>	<i>6.70</i>	<i>4.80</i>	<i>4.20</i>	<i>3.40</i>	<i>3.70</i>	<i>4.00</i>	<i>3.00</i>	<i>3.10</i>
Méningocoques: maladie invasive	2			3	2	2	44	44	35	30	23	30
	<i>1.30</i>			<i>0.50</i>	<i>0.30</i>	<i>0.30</i>	<i>0.50</i>	<i>0.50</i>	<i>0.40</i>	<i>0.60</i>	<i>0.50</i>	<i>0.60</i>
Pneumocoques: maladie invasive	4	4	7	29	26	34	805	813	953	582	569	680
	<i>2.50</i>	<i>2.50</i>	<i>4.40</i>	<i>4.60</i>	<i>4.10</i>	<i>5.40</i>	<i>9.80</i>	<i>9.90</i>	<i>11.70</i>	<i>11.90</i>	<i>11.70</i>	<i>14.00</i>
Rougeole			4	4	1	48	25	70	132	19	17	123
			<i>2.50</i>	<i>0.60</i>	<i>0.20</i>	<i>7.60</i>	<i>0.30</i>	<i>0.90</i>	<i>1.60</i>	<i>0.40</i>	<i>0.40</i>	<i>2.50</i>
Rubéole <sup>c</sup>							5	3	5	4	2	5
							<i>0.06</i>	<i>0.04</i>	<i>0.06</i>	<i>0.08</i>	<i>0.04</i>	<i>0.10</i>
Rubéole, materno-fœtale <sup>d</sup>												
Tuberculose	5	11	17	29	46	46	504	482	487	309	278	326
	<i>3.20</i>	<i>7.00</i>	<i>10.80</i>	<i>4.60</i>	<i>7.30</i>	<i>7.30</i>	<i>6.20</i>	<i>5.90</i>	<i>6.00</i>	<i>6.30</i>	<i>5.70</i>	<i>6.70</i>
Transmission féco-orale												
Campylobactériose	150	194	145	681	746	696	6899	7863	7593	3572	4320	3969
	<i>95.40</i>	<i>123.40</i>	<i>92.20</i>	<i>108.30</i>	<i>118.60</i>	<i>110.70</i>	<i>84.40</i>	<i>96.20</i>	<i>92.90</i>	<i>73.30</i>	<i>88.60</i>	<i>81.40</i>
Hépatite A	2	1	2	4	5	3	48	56	65	24	33	34
	<i>1.30</i>	<i>0.60</i>	<i>1.30</i>	<i>0.60</i>	<i>0.80</i>	<i>0.50</i>	<i>0.60</i>	<i>0.70</i>	<i>0.80</i>	<i>0.50</i>	<i>0.70</i>	<i>0.70</i>
Infection à E. coli entérohémorragique	10	4	4	37	12	12	199	99	72	132	58	41
	<i>6.40</i>	<i>2.50</i>	<i>2.50</i>	<i>5.90</i>	<i>1.90</i>	<i>1.90</i>	<i>2.40</i>	<i>1.20</i>	<i>0.90</i>	<i>2.70</i>	<i>1.20</i>	<i>0.80</i>
Listériose	1	4		4	11	2	66	100	42	32	66	29
	<i>0.60</i>	<i>2.50</i>		<i>0.60</i>	<i>1.80</i>	<i>0.30</i>	<i>0.80</i>	<i>1.20</i>	<i>0.50</i>	<i>0.70</i>	<i>1.40</i>	<i>0.60</i>
Salmonellose, S. typhi/paratyphi					1		16	26	27	8	15	12
					<i>0.20</i>		<i>0.20</i>	<i>0.30</i>	<i>0.30</i>	<i>0.20</i>	<i>0.30</i>	<i>0.20</i>
Salmonellose, autres	43	31	15	124	110	69	1209	1279	1246	564	591	587
	<i>27.40</i>	<i>19.70</i>	<i>9.50</i>	<i>19.70</i>	<i>17.50</i>	<i>11.00</i>	<i>14.80</i>	<i>15.60</i>	<i>15.20</i>	<i>11.60</i>	<i>12.10</i>	<i>12.00</i>
Shigellose	2	2	2	15	9	11	143	146	171	73	74	77
	<i>1.30</i>	<i>1.30</i>	<i>1.30</i>	<i>2.40</i>	<i>1.40</i>	<i>1.80</i>	<i>1.80</i>	<i>1.80</i>	<i>2.10</i>	<i>1.50</i>	<i>1.50</i>	<i>1.60</i>

Office fédéral de la santé publique  
Unité de direction Santé publique  
Division Maladies transmissibles  
Téléphone 058 463 87 06

▶▶▶▶▶▶ Maladies transmissibles


	Semaine 31			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013	2015	2014	2013	2015	2014	2013
<b>Transmission par du sang ou sexuelle</b>												
Chlamydirose	166 <i>105.60</i>	150 <i>95.40</i>	110 <i>70.00</i>	669 <i>106.40</i>	737 <i>117.20</i>	560 <i>89.00</i>	9697 <i>118.60</i>	9551 <i>116.80</i>	8208 <i>100.40</i>	5763 <i>118.20</i>	5760 <i>118.20</i>	4870 <i>99.90</i>
Gonorrhée	34 <i>21.60</i>	15 <i>9.50</i>	41 <i>26.10</i>	139 <i>22.10</i>	109 <i>17.30</i>	149 <i>23.70</i>	1736 <i>21.20</i>	1605 <i>19.60</i>	1727 <i>21.10</i>	1103 <i>22.60</i>	953 <i>19.60</i>	1040 <i>21.30</i>
Hépatite B, aiguë					5 <i>0.80</i>	5 <i>0.80</i>	31 <i>0.40</i>	56 <i>0.70</i>	65 <i>0.80</i>	13 <i>0.30</i>	29 <i>0.60</i>	38 <i>0.80</i>
Hépatite B, total déclarations	9	20	7	117	96	89	1352	1418	1448	802	845	866
Hépatite C, aiguë				1 <i>0.20</i>	3 <i>0.50</i>	2 <i>0.30</i>	38 <i>0.50</i>	62 <i>0.80</i>	52 <i>0.60</i>	24 <i>0.50</i>	40 <i>0.80</i>	28 <i>0.60</i>
Hépatite C, total déclarations	11	22	7	95	109	110	1592	1657	1761	906	979	1058
Infection à VIH	20 <i>12.70</i>	31 <i>19.70</i>	20 <i>12.70</i>	49 <i>7.80</i>	45 <i>7.20</i>	20 <i>3.20</i>	517 <i>6.30</i>	600 <i>7.30</i>	574 <i>7.00</i>	335 <i>6.90</i>	346 <i>7.10</i>	337 <i>6.90</i>
Sida				7 <i>1.10</i>	1 <i>0.20</i>		82 <i>1.00</i>	121 <i>1.50</i>	86 <i>1.00</i>	47 <i>1.00</i>	54 <i>1.10</i>	58 <i>1.20</i>
Syphilis	30 <i>19.10</i>	28 <i>17.80</i>	19 <i>12.10</i>	87 <i>13.80</i>	91 <i>14.50</i>	71 <i>11.30</i>	1062 <i>13.00</i>	1077 <i>13.20</i>	1099 <i>13.40</i>	628 <i>12.90</i>	626 <i>12.80</i>	661 <i>13.60</i>
<b>Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs</b>												
Brucellose	1 <i>0.60</i>			1 <i>0.20</i>			3 <i>0.04</i>	4 <i>0.05</i>	3 <i>0.04</i>	2 <i>0.04</i>	2 <i>0.04</i>	2 <i>0.04</i>
Chikungunya	1 <i>0.60</i>	3 <i>1.90</i>		2 <i>0.30</i>	14 <i>2.20</i>		83 <i>1.00</i>	32 <i>0.40</i>	3 <i>0.04</i>	26 <i>0.50</i>	29 <i>0.60</i>	2 <i>0.04</i>
Dengue	2 <i>1.30</i>	1 <i>0.60</i>	1 <i>0.60</i>	8 <i>1.30</i>	7 <i>1.10</i>	11 <i>1.80</i>	134 <i>1.60</i>	163 <i>2.00</i>	146 <i>1.80</i>	77 <i>1.60</i>	71 <i>1.50</i>	82 <i>1.70</i>
Encéphalite à tiques	8 <i>5.10</i>	7 <i>4.40</i>	7 <i>4.40</i>	30 <i>4.80</i>	26 <i>4.10</i>	60 <i>9.50</i>	115 <i>1.40</i>	163 <i>2.00</i>	149 <i>1.80</i>	75 <i>1.50</i>	73 <i>1.50</i>	113 <i>2.30</i>
Fièvre du Nil occidental								1 <i>0.01</i>	1 <i>0.01</i>			
Fièvre jaune												
Fièvre Q	1 <i>0.60</i>	2 <i>1.30</i>		3 <i>0.50</i>	3 <i>0.50</i>	1 <i>0.20</i>	38 <i>0.50</i>	32 <i>0.40</i>	20 <i>0.20</i>	20 <i>0.40</i>	20 <i>0.40</i>	14 <i>0.30</i>
Infection à Hantavirus							1 <i>0.01</i>	1 <i>0.01</i>	5 <i>0.06</i>	1 <i>0.02</i>	1 <i>0.02</i>	
Paludisme	7 <i>4.40</i>	11 <i>7.00</i>	3 <i>1.90</i>	47 <i>7.50</i>	33 <i>5.20</i>	12 <i>1.90</i>	352 <i>4.30</i>	206 <i>2.50</i>	178 <i>2.20</i>	194 <i>4.00</i>	145 <i>3.00</i>	99 <i>2.00</i>
Trichinellose							1 <i>0.01</i>		2 <i>0.02</i>	1 <i>0.02</i>		1 <i>0.02</i>
Tularémie	1 <i>0.60</i>	3 <i>1.90</i>	1 <i>0.60</i>	3 <i>0.50</i>	8 <i>1.30</i>	7 <i>1.10</i>	38 <i>0.50</i>	24 <i>0.30</i>	40 <i>0.50</i>	13 <i>0.30</i>	13 <i>0.30</i>	17 <i>0.40</i>
<b>Autres déclarations</b>												
Botulisme						1 <i>0.20</i>		1 <i>0.01</i>	1 <i>0.01</i>		1 <i>0.02</i>	1 <i>0.02</i>
Diphthérie <sup>e</sup>				1 <i>0.20</i>			7 <i>0.09</i>	1 <i>0.01</i>		6 <i>0.10</i>		
Maladie de Creutzfeldt-Jakob					2 <i>0.30</i>		19 <i>0.20</i>	19 <i>0.20</i>	16 <i>0.20</i>	12 <i>0.20</i>	9 <i>0.20</i>	11 <i>0.20</i>
Tétanos												

# Situation actuelle: nombre de consultations médicales suite à une piqûre de tique, nombre de cas de borréliose de Lyme et de cas de FSME

Etat au 4 août 2015

Figure 1

Estimation du nombre de consultations médicales suite à une piqûre de tique, du nombre de cas de borréliose de Lyme et de cas de FSME en Suisse de 2013 à 2015 (jusqu'à la semaine 31)



## Estimation du nombre de consultations médicales suite à une piqûre de tique et de cas de borréliose de Lyme

À la fin de la semaine 31/2015, l'extrapolation pour le début de l'année 2015 fournit une estimation de 10000 consultations pour piqûre de tique (figure 1, en haut; tableau 1). Ce chiffre correspond environ aux extrapolations des années précédentes.

Pour les 31 premières semaines de l'année 2015, le nombre extrapolé de

cas de borréliose de Lyme aiguë s'élève à 3000 (figure 1, au milieu; tableau 1). Ce chiffre est bas, comparé aux années précédentes.

## Nombre de cas de méningo-encéphalite verno-estivale (FSME) déclarés

Le nombre de déclarations hebdomadaires est sujet à de fortes fluctuations. Depuis 2000, de 39 à 172 cas de FSME ont été déclarés durant les semaines 1 à 31. Septante-


trois cas ont été signalés jusqu'à la semaine 31 de l'année en cours (figure 1, en bas; figure 2).

Tableau 1  
**Estimation du nombre de consultations médicales suite à une piqûre de tique et de cas de borréliose de Lyme en Suisse de 2008 à 2015 (semaines 1 à 31)**

Année d'apparition de la maladie	Borréliose de Lyme	Consultations pour piqûre de tique
2008	8000	20000
2009	6000	10000
2010	5000	10000
2011	8000	20000
2012	6000	10000
2013	8000	20000
2014	5000	10000
2015	3000	10000

**Contact**  
 Office fédéral de la santé publique  
 Unité de direction Santé publique  
 Division Maladies transmissibles  
 Téléphone 058 463 87 06

Figure 2  
**Nombre de cas de FSME en Suisse, 2000 – 2015 (semaines 1 à 31)**



### Explications sur la collecte et l'analyse des données

Les piqûres de tiques et les cas de borréliose de Lyme sont recensés dans le système de déclaration Sentinella depuis 2008. Au sein de ce réseau, des médecins de premier recours (généralistes, internistes et pédiatres) communiquent chaque semaine leurs observations, sur une base volontaire. Les résultats sont ensuite extrapolés pour l'ensemble de la Suisse. Il s'agit ainsi d'estimations.

Par borréliose de Lyme aiguë on entend un érythème migrant et/ou un lymphocytome borrélien. Les formes chroniques de borréliose de Lyme sont aussi déclarées, mais elles ne figurent pas dans les présentes statistiques, afin de représenter exclusivement les cas survenus durant la saison à tiques.

L'estimation du nombre de consultations médicales suite à des cas de borréliose peut être supérieure à celles dues à une piqûre de tique si, durant la période considérée, des cas de borréliose de Lyme sans lien direct avec une piqûre de tique récente sont déclarés. En effet, seuls 50% des patients atteints d'une borréliose de Lyme aiguë se rappellent d'avoir été piqués par une tique.

Les cas de méningo-encéphalite verno-estivale (FSME) sont enregistrés dans le système de déclaration obligatoire. Les médecins et les laboratoires sont tenus de signaler tous les cas au médecin cantonal et à l'OFSP. Il s'agit ainsi d'un nombre de cas précis.

Les analyses fournies dans le présent rapport de situation se basent sur la date à laquelle la maladie est apparue; quant aux statistiques publiées sur Internet et dans le bulletin de l'OFSP, elles se basent sur la date du test ou de la déclaration. Il peut en résulter certaines différences statistiques. De plus, des déclarations ultérieures ou la classification définitive des cas peuvent en modifier le nombre.

# Maladies transmissibles

## Statistique Sentinella

### Déclarations (N) sur 4 semaines jusqu'au 31.7.2015 et incidence par 1000 consultations (N/10<sup>3</sup>)

Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	28		29		30		31		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>
Thème										
Suspicion d'influenza	5	0.5	2	0.2	2	0.2	0	0	2.3	0.2
Oreillons	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0.3	0
Otite moyenne	38	3.5	33	3.6	23	2.8	11	1.5	26.3	2.8
Pneumonie	4	0.4	7	0.8	2	0.2	5	0.7	4.5	0.5
Coqueluche	2	0.2	1	0.1	3	0.4	0	0	1.5	0.2
Piqûre de tiques	23	2.1	19	2.1	9	1.1	7	1.0	14.5	1.6
Borréliose de Lyme	7	0.6	7	0.8	3	0.4	10	1.4	6.8	0.8
Vaccination contre la coqueluche (>=16 ans)	24	2.2	25	2.7	19	2.3	19	2.7	21.8	2.5
Vaccination de rattrapage contre la rougeole (>24 mois)	14	1.3	17	1.8	8	1.0	9	1.3	12	1.3
Médecins déclarants	128		109		98		84		104.8	
Données provisoires										

# Liste des spécialités

La Liste des spécialités peut être consultée sur internet sous : [www.listedesspecialites.ch](http://www.listedesspecialites.ch)

## Valable à partir du 1<sup>er</sup> août 2015

{ } Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé

### I. Nouvelles admissions des préparations

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
01.05.00		<b>Fluanxol</b> (Flupentixolum)	Lundbeck (Schweiz) AG		
	20384	Filmtabl 0.500 mg 50 Stk Fr. 9.60 {4.78}		62047001	01.08.2015, B
	20384	<b>Fluanxol</b> (Flupentixolum)	Lundbeck (Schweiz) AG		
	20384	Filmtabl 1 mg 50 Stk Fr. 14.65 {5.61}		62047002	01.08.2015, B
	20384	<b>Fluanxol</b> (Flupentixolum)	Lundbeck (Schweiz) AG		
	20384	Filmtabl 5 mg 50 Stk Fr. 44.35 {24.35}		62047003	01.08.2015, B
01.99.00 (L)G		<b>Memantin Sandoz</b> (Memantinum hydrochloridum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20387	Filmtabl 10 mg 50 Stk Fr. 90.45 {64.51}		65207001	01.08.2015, B
(L)G	20387	<b>Memantin Sandoz</b> (Memantinum hydrochloridum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20387	Filmtabl 20 mg 98 Stk Fr. 292.05 {240.13}		65207002	01.08.2015, B
(L)G	20387	<b>Memantin Sandoz Starterpackung</b> (Memantinum hydrochloridum, Memantinum hydrochloridum, Memantinum hydrochloridum)	Sandoz Pharmaceuticals AG		
	20387	Filmtabl 7x5/7x10/7x15/7x20mg 28 Stk Fr. 63.60 {41.10}		65207003	01.08.2015, B
	20332	<b>Plegridy</b> (Peginterferonum beta-1a)	Biogen Idec Switzerland AG		
	20332	Inj Lös 125 mcg/0.5 ml Fertpen 2 Stk Fr. 1'370.00 {1'193.09}		65242002	01.08.2015, B
	20345	<b>Plegridy</b> (Peginterferonum beta-1a)	Biogen Idec Switzerland AG		
	20345	Inj Lös 125 mcg/0.5 ml Fertspr 2 Stk Fr. 1'370.00 {1'193.09}		65240002	01.08.2015, B
	20332	<b>Plegridy 63mcg/0.5ml+94mcg/0.5ml</b> (Peginterferonum beta-1a, Peginterferonum beta-1a)	Biogen Idec Switzerland AG		
	20332	Inj Lös Fertpen 2 Stk Fr. 1'317.80 {1'145.48}		65242001	01.08.2015, B
	20345	<b>Plegridy 63mcg/0.5ml+94mcg/0.5ml</b> (Peginterferonum beta-1a, Peginterferonum beta-1a)	Biogen Idec Switzerland AG		
	20345	Inj Lös Fertspr 2 Stk Fr. 1'317.80 {1'145.48}		65240001	01.08.2015, B
02.05.10 G	20388	<b>Rizatriptan Mepha oro</b> (Rizatriptanum)	Mepha Pharma AG		
	20388	Schmelztabl 5 mg 6 Stk Fr. 47.65 {27.20}		65799001	01.08.2015, B
G	20388	<b>Rizatriptan Mepha oro</b> (Rizatriptanum)	Mepha Pharma AG		
	20388	Schmelztabl 10 mg 3 Stk Fr. 34.35 {15.64}		65799002	01.08.2015, B
	20388	Schmelztabl 10 mg 6 Stk Fr. 48.00 {27.51}		65799003	01.08.2015, B
	20388	Schmelztabl 10 mg 12 Stk Fr. 75.30 {51.30}		65799004	01.08.2015, B
07.16.10 G	20382	<b>Docetaxel Labatec</b> (Docetaxelum)	Labatec Pharma SA		
	20382	Inf Konz 20 mg/1ml Durchstf 1 Stk Fr. 122.30 {92.23}		65363001	01.08.2015, A
G	20382	<b>Docetaxel Labatec</b> (Docetaxelum)	Labatec Pharma SA		
	20382	Inf Konz 80 mg/4ml 1 Stk Fr. 438.20 {367.40}		65363002	01.08.2015, A

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
G	20382	<b>Docetaxel Labatec</b> (Docetaxelum) Inf Konz 140 mg/7ml 1 Stk Fr. 757.55 {645.61}	Labatec Pharma SA	65363003	01.08.2015, A
08.03.00 (L)		<b>Daklinza</b> (Daclatasvirum)	Bristol-Myers Squibb SA		
<p>En association avec Sovaldi chez les patients atteints d'hépatite C chronique (HCC) de génotype 3 ou en association avec le peginterféron alfa et la ribavirine chez les patients atteints d'hépatite C chronique (HCC) de génotype 4, qui répondent à un des critères suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fibrose hépatique de degré 3 ou 4 prouvée par biopsie (score Métavir) ou rigidité accrue du foie de &gt;9,5 kPa mesurée deux fois à intervalle d'au moins 3 mois au moyen de Fibroscan.</li> <li>- patients symptomatiques présentant une manifestation extrahépatique de l'hépatite C indépendamment des lésions hépatiques.</li> </ul> <p>La durée maximale de traitement remboursée est :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- patients de génotype 4 de HCV : 24 semaines (24 semaines avec Daklinza en association 24 à 48 semaines avec le peginterféron alfa et la ribavirine),</li> <li>- pour patients de génotype 3 de HCV : 12 semaines</li> </ul> <p>La prescription doit se faire exclusivement par des spécialistes en gastro-entérologie, en particulier les détenteurs du titre hépatologue ou par des spécialistes en infectiologie ainsi que par des médecins sélectionnés expérimentés dans le domaine de la médecine d'addiction et dans le traitement de l'HCC. La liste correspondante des médecins expérimentés en médecine d'addiction et dans le traitement de l'HCC est consultable à l'adresse suivante : <a href="http://www.bag.admin.ch/lis-ref">http://www.bag.admin.ch/lis-ref</a>.</p>					
	20329	Filmtabl 30 mg 28 Stk Fr. 11'663.80 {11'139.33}		65332001	01.08.2015, A
(L)	20329	<b>Daklinza</b> (Daclatasvirum) Filmtabl 60 mg 28 Stk Fr. 11'663.80 {11'139.33}	Bristol-Myers Squibb SA	65332002	01.08.2015, A
G	20389	<b>Valganciclovir Mepha</b> (Valganciclovirum) Lactabs 450 mg 60 Stk Fr. 1'502.10 {1'313.50}	Mepha Pharma AG	65032001	01.08.2015, A
G	20386	<b>Valganciclovir Sandoz</b> (Valganciclovirum) Filmtabl 450 mg 60 Stk Fr. 1'581.25 {1'385.67}	Sandoz Pharmaceuticals AG	65221001	01.08.2015, A
11.06.30	20360	<b>Hydrocortison-POS</b> (Hydrocortisoni acetat) Augensalbe 1 % Tb 2.500 g Fr. 8.30 {3.65}	Ursapharm Schweiz GmbH	63125001	01.08.2015, B

{ } Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé.

### II. Autres emballages et dosages

07.10.60 G	20191	<b>Methrex</b> (Methotrexatum) Inj Lös 12.500 mg/0.625ml Fertspr 0.625 ml Fr. 36.80 {17.77}	Sandoz Pharmaceuticals AG	62083010	01.08.2015, A
G	20191	<b>Methrex</b> (Methotrexatum) Inj Lös 17.500 mg/0.875ml Fertspr 0.875 ml Fr. 39.55 {20.18}	Sandoz Pharmaceuticals AG	62083011	01.08.2015, A

Conformément à l'art. 68, al. 2, de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMa) la radiation d'un médicament de la LS prend effet trois mois après avoir été publiée dans le bulletin de l'OFSP.

{ } Le prix de fabrique servant de base au prix public autorisé.

### III. Préparations/emballages radiés

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
01.05.00	9307	<b>Haldol</b> (Haloperidolum) Tropfen 10 mg/ml 30 ml Fr. 26.70 {12.57}	Janssen-Cilag AG	26892074	01.08.2015, B
02.04.10	15301	<b>Corangin</b> (Isosorbidi mononitrat) Divitabs 40 mg 50 Stk Fr. 14.90 {5.83}	Novartis Pharma Schweiz AG	49061021	01.08.2015, B
	15301	<b>Corangin</b> (Isosorbidi mononitrat) Divitabs 60 mg 50 Stk Fr. 16.75 {7.44}	Novartis Pharma Schweiz AG	49061056	01.08.2015, B

▶▶▶▶▶ Assurance maladie et accidents

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
02.07.10		<b>Cibacen 20</b> (Benazeprili hydrochloridum) Tabl 20 mg 28 Stk Fr. 56.75 {35.16}	Novartis Pharma Schweiz AG		
	15740			50583139	01.08.2015, B
		<b>Cibacen 5</b> (Benazeprili hydrochloridum) Tabl 5 mg 28 Stk Fr. 27.15 {12.95}	Novartis Pharma Schweiz AG		
	15740			50583023	01.08.2015, B
	15740	Tabl 5 mg 98 Stk Fr. 60.80 {38.66}		50583031	01.08.2015, B
02.07.20		<b>Cibadrex 10/12.5</b> (Benazeprili hydrochloridum, Hydrochlorothiazidum) Tabl 10/12.5 mg 28 Stk Fr. 18.15 {8.68}	Novartis Pharma Schweiz AG		
	15991			51794044	01.08.2015, B
		<b>Cibadrex 20/25</b> (Benazeprili hydrochloridum, Hydrochlorothiazidum) Tabl 20/25 mg 28 Stk Fr. 28.65 {14.24}	Novartis Pharma Schweiz AG		
	15991			51794060	01.08.2015, B
(L)		<b>Cibadrex 5/6.25</b> (Benazeprili hydrochloridum, Hydrochlorothiazidum) Tabl 5/6.25 mg 98 Stk Fr. 34.70 {15.92}	Novartis Pharma Schweiz AG		
	15991			51794036	01.08.2015, B
06.07.30 (L)		<b>Aranesp Sure Click Pen</b> (Darbepoetinum alfa) Inj Lös 20 mcg 1 Stk Fr. 69.30 {46.09}	Amgen Switzerland AG		
	18254			57470005	01.08.2015, A
(L)		<b>Aranesp Sure Click Pen</b> (Darbepoetinum alfa) Inj Lös 40 mcg 1 Stk Fr. 122.30 {92.24}	Amgen Switzerland AG		
	18254			57470009	01.08.2015, A
(L)		<b>Aranesp Sure Click Pen</b> (Darbepoetinum alfa) Inj Lös 60 mcg 1 Stk Fr. 175.25 {138.36}	Amgen Switzerland AG		
	18254			57470013	01.08.2015, A
(L)		<b>Aranesp Sure Click Pen</b> (Darbepoetinum alfa) Inj Lös 80 mcg 1 Stk Fr. 228.20 {184.47}	Amgen Switzerland AG		
	18254			57470015	01.08.2015, A
(L)		<b>Aranesp Sure Click Pen</b> (Darbepoetinum alfa) Inj Lös 100 mcg 1 Stk Fr. 281.15 {230.60}	Amgen Switzerland AG		
	18254			57470017	01.08.2015, A
(L)		<b>Aranesp Sure Click Pen</b> (Darbepoetinum alfa) Inj Lös 130 mcg 1 Stk Fr. 360.55 {299.77}	Amgen Switzerland AG		
	18254			57470025	01.08.2015, A
(L)		<b>Aranesp Sure Click Pen</b> (Darbepoetinum alfa) Inj Lös 300 mcg 1 Stk Fr. 810.55 {691.79}	Amgen Switzerland AG		
	18254			57470021	01.08.2015, A
07.06.20 (L)		<b>Galvumet</b> (Vildagliptinum, Metformini hydrochloridum) Filmtabl 50/500 mg 30 Stk Fr. 47.65 {27.20}	Novartis Pharma Schweiz AG		
	19118			58451001	01.08.2015, B
(L)		<b>Galvumet</b> (Vildagliptinum, Metformini hydrochloridum) Filmtabl 50/850 mg 30 Stk Fr. 47.65 {27.20}	Novartis Pharma Schweiz AG		
	19118			58451003	01.08.2015, B
(L)		<b>Galvumet</b> (Vildagliptinum, Metformini hydrochloridum) Filmtabl 50/1000 mg 30 Stk Fr. 47.65 {27.20}	Novartis Pharma Schweiz AG		
	19118			58451005	01.08.2015, B
07.12.00 G		<b>Atorvastatin Mepha</b> (Atorvastatinum) Lactabs 10 mg (alt) 30 Stk Fr. 28.70 {14.27}	Mepha Pharma AG		
	19913			62211001	01.08.2015, B
	19913	Lactabs 10 mg (alt) 100 Stk Fr. 70.30 {46.94}		62211002	01.08.2015, B
G		<b>Atorvastatin Mepha</b> (Atorvastatinum) Lactabs 20 mg (alt) 30 Stk Fr. 28.70 {14.27}	Mepha Pharma AG		
	19913			62211003	01.08.2015, B
	19913	Lactabs 20 mg (alt) 100 Stk Fr. 70.30 {46.94}		62211004	01.08.2015, B

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
G		<b>Atorvastatin Mepha</b> (Atorvastatinum)	Mepha Pharma AG		
	19913	Lactabs 40 mg (alt) 30 Stk Fr. 28.70 {14.27}		62211005	01.08.2015, B
	19913	Lactabs 40 mg (alt) 100 Stk Fr. 70.30 {46.94}		62211006	01.08.2015, B
G		<b>Atorvastatin Mepha</b> (Atorvastatinum)	Mepha Pharma AG		
	19913	Lactabs 80 mg (alt) 30 Stk Fr. 28.70 {14.27}		62211007	01.08.2015, B
	19913	Lactabs 80 mg (alt) 100 Stk Fr. 70.30 {46.94}		62211008	01.08.2015, B
07.16.10 O		<b>Campto</b> (Irinotecani hydrochloridum trihydricum)	Pfizer AG		
	17119	Inf Konz 40 mg/2ml Durchstf 2 ml Fr. 93.25 {66.94}		53470017	01.08.2015, A
O		<b>Campto</b> (Irinotecani hydrochloridum trihydricum)	Pfizer AG		
	17119	Inf Konz 100 mg/5ml Durchstf 5 ml Fr. 202.60 {162.20}		53470025	01.08.2015, A
07.99.00 (L)		<b>Prolia</b> (Denosumabum)	Amgen Switzerland AG		
	19236	Inj Lös 60 mg/ml o Nadelschutz verblst Fertigspr 1 Stk Fr. 335.05 {277.59}		60211001	01.08.2015, B
(L)		<b>Prolia</b> (Denosumabum)	Amgen Switzerland AG		
	19236	Inj Lös 60 mg/ml o Nadelschutz unverblst Fertigspr 1 Stk Fr. 335.05 {277.59}		60211002	01.08.2015, B
40.00.00		<b>Chinidinium sulfuric</b> ( )			
	13974	Tabl 200 mg 20 Stk Fr. 12.25 { }			01.08.2015,
	13974	Tabl 200 mg 100 Stk Fr. 52.00 { }			01.08.2015,

#### IV. Réductions de prix volontaires

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Lukair</b> Filmtabl 10 mg 28 Stk Filmtabl 10 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	030450 20024 20024	43.40 111.05	23.52 82.45	
<b>Lukair</b> Kautabl 5 mg 28 Stk Kautabl 5 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	030450 20025 20025	43.40 111.05	23.52 82.45	
<b>Lukair</b> Kautabl 4 mg 28 Stk Kautabl 4 mg 98 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	030450 20025 20025	43.40 111.05	23.52 82.45	
<b>Lukair</b> Gran 4 mg Btl 28 Stk	MSD Merck Sharp & Dohme AG	030450 20026	43.40	23.52	
<b>Oxycontin</b> Ret Tabl 40 mg 60 Stk	Mundipharma Medical Company Hamilton, Bermuda, Basel Branch	010130 17356	175.40	138.50	
<b>Oxycontin</b> Ret Tabl 80 mg 60 Stk	Mundipharma Medical Company Hamilton, Bermuda, Basel Branch	010130 17356	302.60	249.30	

#### Iva. Réductions de prix après échéance du brevet

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Valcyte</b> Filmtabl 60 Stk	Roche Pharma (Schweiz) AG	080300 17787	1'961.15	1'732.09	

**IVb. Réductions de prix après 18 mois depuis l'admission sur la LS**

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Relvar Ellipta</b> Inh Plv 92mcg/22mcg 30 Dos	GlaxoSmithKline AG	030430 20105	61.65	39.43	
<b>Relvar Ellipta</b> Inh Plv 184mcg/22mcg 30 Dos	GlaxoSmithKline AG	030430 20105	73.80	50.01	

**V. Réductions de prix après élargissement de la limitation/de l'indication**

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Exviera</b> Filmtabl 250 mg 56 Stk	AbbVie AG	080300 20303	1'356.85	1'181.09	
<b>Olysis</b> Kaps 150 mg 28 Stk	Janssen-Cilag AG	080300 20313	10'719.95	10'218.50	
<b>Ozurdex intravitreales</b> Implant in Applikator 1 Stk	Allergan AG	119900 19470	1'382.00	1'204.02	
<b>Viekirax</b> Filmtabl 12.5/75/50 56 Stk	AbbVie AG	080300 20307	13'983.10	13'402.05	

**VI. Augmentations de prix**

Préparations/substances actives/emballages	Maison responsable	Groupe thérapeut.	N° du dossier	nouveau prix	nouveau ex-fact
<b>Puri Nethol</b> Tabl 50 mg 25 Stk	Pro Farma AG	071610 7441	86.55	61.10	

**VII. Modifications de la limitation/de l'indication**

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
07.08.40 (L)	13737	<b>Andriol Testocaps</b> (Testosteroni undecylas) Kaps 40 mg 60 Stk Fr. 46.95 {26.62}	MSD MERCK SHARP & DOHME AG	42028029	15.03.1981, B

**Vieille limitation:**

Pour les indications gynécologiques ainsi que pour l'hypogonadisme mâle et l'induction de la puberté.

**Nouvelle limitation:**

Traitement substitutif par la testostérone chez les hommes souffrant d'hypogonadisme congénital ou d'hypogonadisme acquis primaire ou secondaire.

Andriol Testocaps n'est pas admis pour le traitement de femmes ou d'enfants impubères.

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
08.03.00 (L)	20303	<b>Exviera</b> (Dasabuvirum) Filmtabl 250 mg	ABBVIE AG	65302001	01.02.2015, A

**Vieille limitation:**

En association avec Viekirax ou avec Viekirax et la ribavirine dans le traitement des adultes atteints d'hépatite C chronique (HCC) de génotype 1 qui remplissent l'un des critères suivants :

– fibrose hépatique de degré 3 ou 4 prouvée par biopsie (score Métavir) ou rigidité accrue du foie de >9.5 kPa mesurée deux fois à intervalle d'au moins 3 mois au moyen de Fibroscan.

– patients symptomatiques présentant une manifestation extrahépatique de l'hépatite C indépendamment des lésions hépatiques.

La durée maximale de remboursement sera limitée comme suit:

– Patients avec une infection par le VHC de génotype 1b, sans cirrhose: 12 semaines

– Patients avec une infection par le VHC de génotype 1a, sans cirrhose: 12 semaines

– Patients avec une infection par le VHC de génotype 1, avec cirrhose: 12 semaines

– Patients infectés par le VHC de génotype 1a, avec cirrhose, déjà traités précédemment et n'ayant pas atteint de réponse sous interféron et ribavirine (répondeurs nuls): 24 semaines.

La prescription doit se faire exclusivement par des spécialistes en gastro-entérologie, en particulier les détenteurs du titre hépatologue ou par des spécialistes en infectiologie ainsi que par des médecins sélectionnés expérimentés en toxicomanie et dans le traitement de l'HCC. La liste correspondante des médecins expérimentés en toxicomanie et dans le traitement de l'HCC est consultable à l'adresse suivante : <http://www.bag.admin.ch/lis-ref>.

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
----------------------	---------------	---	--------------------	----------	-------------------

**Nouvelle limitation:**

En association avec Viekirax ou avec Viekirax et la ribavirine dans le traitement des adultes atteints d'hépatite C chronique (HCC) de génotype 1 qui remplissent l'un des critères suivants:

- fibrose hépatique de degré 2, 3 ou 4 prouvée par biopsie (score Métavir) ou rigidité accrue du foie de  $\geq 7.5$  kPa mesurée deux fois à intervalle d'au moins 3 mois au moyen de Fibroscan.
- patients symptomatiques présentant une manifestation extrahépatique de l'hépatite C indépendamment des lésions hépatiques. La durée maximale de remboursement sera limitée comme suit:
- Patients avec une infection par le VHC de génotype 1b, sans cirrhose: 12 semaines
- Patients avec une infection par le VHC de génotype 1a, sans cirrhose: 12 semaines
- Patients avec une infection par le VHC de génotype 1, avec cirrhose: 12 semaines
- Patients infectés par le VHC de génotype 1a, avec cirrhose, déjà traités précédemment et n'ayant pas atteint de réponse sous interféron et ribavirine (répondeurs nuls): 24 semaines.

La prescription doit se faire exclusivement par des spécialistes en gastro-entérologie, en particulier les détenteurs du titre hépatologue ou par des spécialistes en infectiologie ainsi que par des médecins sélectionnés expérimentés en toxicomanie et dans le traitement de l'HCC. La liste correspondante des médecins expérimentés en toxicomanie et dans le traitement de l'HCC est consultable à l'adresse suivante: <http://www.bag.admin.ch/sl-ref>.

(L)		<b>Olysio</b> (Simeprevirum)	JANSSEN-CILAG AG		
	20313	Kaps 150 mg 7 Stk Fr. 2899.20 {2588.47}		63215001	01.04.2015, A
	20313	Kaps 150 mg 28 Stk Fr. 10'719.95 {10'218.50}		63215002	01.04.2015, A

**Vieille limitation:**

En association avec le peg-interféron alfa et la ribavirine pour le traitement de l'hépatite C chronique (HCC) chez les patients adultes atteints d'une affection hépatique compensée (y compris la cirrhose) avec ou sans co-infection par le virus de l'immunodéficience humaine 1 (VIH 1):

- qui sont naïfs de tout traitement (génotype 1) 1) et 4)
- qui ont présenté une récurrence après un traitement antérieur par interféron (pégylé ou non pégylé) avec ou sans ribavirine (génotype 1) 1) ou 4)
- ou en cas d'échec d'un traitement antérieur par interféron (pégylé ou non pégylé) avec ou sans ribavirine (non répondeurs, y compris réponse partielle et manquante) (génotype 1) 1))

1) à l'exception des patients avec VHC génotype 1a avec polymorphisme NS3 Q80K et qui répondent aux critères suivants:

fibrose hépatique de degré 3 ou 4 (score Métavir) mise en évidence par biopsie ou raideur hépatique accrue de  $>9,5$  kPa mesurée deux fois par Fibroscan en l'espace d'au moins 3 mois.

Patients symptomatiques présentant une manifestation extrahépatique de l'hépatite C indépendamment des lésions hépatiques. La durée maximale du remboursement d'Olysio est de 12 semaines.

La prescription doit uniquement avoir lieu par des spécialistes en gastro-entérologie, en particulier porteurs du titre prioritaire hépatologie ou par des spécialistes en infectiologie ainsi que par des médecins sélectionnés expérimentés dans le domaine de la médecine de l'addiction et dans le traitement du CHC. La liste ad hoc des médecins expérimentés dans le domaine de la médecine de l'addiction et dans le traitement du CHC est consultable à l'adresse: <http://www.bag.admin.ch/sl-ref>.

Les traitements associés avec d'autres médicaments pour l'hépatite C ne sont pas remboursés.

Les coûts pour le test du polymorphisme NS3 Q80K sont pris en charge par la société Janssen-Cilag AG.

**Nouvelle limitation:**

En association avec le peg-interféron alfa et la ribavirine pour le traitement de l'hépatite C chronique (HCC) chez les patients adultes atteints d'une affection hépatique compensée (y compris la cirrhose) avec ou sans co-infection par le virus de l'immunodéficience humaine 1 (VIH 1):

- qui sont naïfs de tout traitement (génotype 1) 1) et 4)
- qui ont présenté une récurrence après un traitement antérieur par interféron (pégylé ou non pégylé) avec ou sans ribavirine (génotype 1) 1) ou 4)
- ou en cas d'échec d'un traitement antérieur par interféron (pégylé ou non pégylé) avec ou sans ribavirine (non répondeurs, y compris réponse partielle et manquante) (génotype 1) 1))

1) à l'exception des patients avec VHC génotype 1a avec polymorphisme NS3 Q80K et qui répondent aux critères suivants:

fibrose hépatique de degré 2, 3 ou 4 (score Métavir) mise en évidence par biopsie ou raideur hépatique accrue de  $\geq 7,5$  kPa mesurée deux fois par Fibroscan en l'espace d'au moins 3 mois.

Patients symptomatiques présentant une manifestation extrahépatique de l'hépatite C indépendamment des lésions hépatiques. La durée maximale du remboursement d'Olysio est de 12 semaines.

La prescription doit uniquement avoir lieu par des spécialistes en gastro-entérologie, en particulier porteurs du titre prioritaire hépatologie ou par des spécialistes en infectiologie ainsi que par des médecins sélectionnés expérimentés dans le domaine de la

Groupe thérapeutique	N° du dossier	Préparation/ substances actives/emballages	Maison responsable	N° d'ISM	Année d'admission
----------------------	---------------	---	--------------------	----------	-------------------

médecine de l'addiction et dans le traitement du CHC. La liste ad hoc des médecins expérimentés dans le domaine de la médecine de l'addiction et dans le traitement du CHC est consultable à l'adresse : <http://www.bag.admin.ch/sl-ref>.

Les traitements associés avec d'autres médicaments pour l'hépatite C ne sont pas remboursés.

Les coûts pour le test du polymorphisme NS3 Q80K sont pris en charge par la société Janssen-Cilag AG.

(L)		<b>Viekirax</b> (Ombitasvirum, Paritaprevirum, Ritonavirum)	ABBVIE AG		
	20307	Filmtabl 12.5/75/50 mg 56 Stk Fr. 13'983.10 {13'402.05}		65301001	01.02.2015, A

#### Vieille limitation:

En association avec Exviera ou avec Exviera et la ribavirine dans le traitement des adultes atteints d'hépatite C chronique (HCC) de génotype 1 qui remplissent l'un des critères suivants :

- fibrose hépatique de degré 3 ou 4 prouvée par biopsie (score Métavir) ou rigidité accrue du foie de >9.5 kPa mesurée deux fois à intervalle d'au moins 3 mois au moyen de Fibroscan.
- patients symptomatiques présentant une manifestation extrahépatique de l'hépatite C indépendamment des lésions hépatiques.

La durée maximale de remboursement sera limitée comme suit :

- Patients avec une infection par le VHC de génotype 1b, sans cirrhose : 12 semaines
- Patients avec une infection par le VHC de génotype 1a, sans cirrhose : 12 semaines
- Patients avec une infection par le VHC de génotype 1, avec cirrhose : 12 semaines
- Patients infectés par le VHC de génotype 1a, avec cirrhose, déjà traités précédemment et n'ayant pas atteint de réponse sous interféron et ribavirine (répondeurs nuls) : 24 semaines.

La prescription doit se faire exclusivement par des spécialistes en gastro-entérologie, en particulier les détenteurs du titre hépatologue ou par des spécialistes en infectiologie ainsi que par des médecins sélectionnés expérimentés en toxicomanie et dans le traitement de l'HCC. La liste correspondante des médecins expérimentés en toxicomanie et dans le traitement de l'HCC est consultable à l'adresse suivante : <http://www.bag.admin.ch/ls-ref>.

#### Nouvelle limitation:

En association avec Exviera ou avec Exviera et la ribavirine dans le traitement des adultes atteints d'hépatite C chronique (HCC) de génotype 1 qui remplissent l'un des critères suivants :

- fibrose hépatique de degré 2, 3 ou 4 prouvée par biopsie (score Métavir) ou rigidité accrue du foie de  $\geq 7.5$  kPa mesurée deux fois à intervalle d'au moins 3 mois au moyen de Fibroscan.
- patients symptomatiques présentant une manifestation extrahépatique de l'hépatite C indépendamment des lésions hépatiques.

La durée maximale de remboursement sera limitée comme suit :

- Patients avec une infection par le VHC de génotype 1b, sans cirrhose : 12 semaines
- Patients avec une infection par le VHC de génotype 1a, sans cirrhose : 12 semaines
- Patients avec une infection par le VHC de génotype 1, avec cirrhose : 12 semaines
- Patients infectés par le VHC de génotype 1a, avec cirrhose, déjà traités précédemment et n'ayant pas atteint de réponse sous interféron et ribavirine (répondeurs nuls) : 24 semaines.

La prescription doit se faire exclusivement par des spécialistes en gastro-entérologie, en particulier les détenteurs du titre hépatologue ou par des spécialistes en infectiologie ainsi que par des médecins sélectionnés expérimentés en toxicomanie et dans le traitement de l'HCC. La liste correspondante des médecins expérimentés en toxicomanie et dans le traitement de l'HCC est consultable à l'adresse suivante : <http://www.bag.admin.ch/ls-ref>.

11.99.00		<b>Ozurdex intravitreales</b> (Dexamethasonum)	ALLERGAN AG		
(L)	19470	Implant in Applikator 0,7 mg 1 Stk Fr. 1382.00 {1204.02}		60324001	01.01.2012, A

#### Vieille limitation:

L'utilisation d'OZURDEX est limitée à deux applications.

#### Nouvelle limitation:

##### Œdème maculaire après occlusion de la branche veineuse ou centrale de la rétine

L'utilisation est limitée à 2 applications d'implants.

Les patients répondant à la thérapie peuvent poursuivre le traitement après garantie de prise en charge des coûts par l'assureur-maladie et consultation préalable du médecin-conseil.

##### Uvéite

Administrations répétées en cas d'uvéite non infectieuse dans le segment postérieur chez les patients répondant à la thérapie après garantie de prise en charge des coûts par l'assureur-maladie et consultation préalable du médecin-conseil.

##### Troubles de la vision en raison d'un œdème maculaire diabétique

Chez les patients pseudophaques ou ne répondant pas suffisamment à une thérapie sans corticostéroïdes, ou chez lesquels cette dernière est considérée non conforme.

L'utilisation est limitée à 7 applications d'implants.

Les patients répondant à la thérapie peuvent poursuivre le traitement après garantie de prise en charge des coûts par l'assureur-maladie et consultation préalable du médecin-conseil.

#### VIII. Mutations de noms

Atromed Rheuma-Gel sera ATROMED  
Harpagomed Rheuma-Tabletten sera HARPAGOMED

**P.P. A**

CH-3003 Berne  
Post CH AG

Indiquer les changements  
d'adresse :

Bulletin de l'OFSP  
OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne

# Bulletin 33/15