



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI  
Office fédéral de la santé publique OFSP

Édition du 9 mars 2020

Semaine

# OFSP-Bulletin 11/2020

Magazine d'information pour professionnels de la santé et pour les médias

**VOICI COMMENT  
NOUS PROTÉGER:**



[www.ofsp-coronavirus.ch](http://www.ofsp-coronavirus.ch)

# Impressum

## ÉDITEUR

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne (Suisse)  
[www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

## RÉDACTION

Office fédéral de la santé publique  
CH-3003 Berne  
Téléphone 058 463 87 79  
[drucksachen-bulletin@bag.admin.ch](mailto:drucksachen-bulletin@bag.admin.ch)

## IMPRESSION

Stämpfli AG  
Wölflistrasse 1  
CH-3001 Berne  
Téléphone 031 300 66 66

## ABONNEMENTS, CHANGEMENTS D'ADRESSE

OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne  
Téléphone 058 465 5050  
Fax 058 465 50 58  
[verkauf.zivil@bbl.admin.ch](mailto:verkauf.zivil@bbl.admin.ch)

ISSN 1420-4266

## DISCLAIMER

Le bulletin de l'OFSP est une revue spécialisée hebdomadaire, en français et en allemand, qui s'adresse aux professionnels de la santé, aux médias et aux milieux intéressés. Ce périodique publie les derniers chiffres en matière de santé ainsi que des informations importantes de l'OFSP.

Abonnez-vous pour recevoir la version électronique du bulletin :  
[www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin](http://www.bag.admin.ch/ofsp-bulletin)

# Sommaire

Déclarations des maladies infectieuses	4
Statistique Sentinella	6
Voici comment nous protéger: <a href="http://www.ofsp-coronavirus.ch">www.ofsp-coronavirus.ch</a>	7
Rapport hebdomadaire des affections grippales	8
Mesures de prévention et d'hygiène essentielles	13

# Déclarations des maladies infectieuses

## Situation à la fin de la 9<sup>e</sup> semaine (03.03.2020)<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Déclarations des médecins et des laboratoires selon l'ordonnance sur la déclaration. Sont exclus les cas de personnes domiciliées en dehors de la Suisse et de la principauté du Liechtenstein. Données provisoires selon la date de la déclaration. Les chiffres écrits en gris correspondent aux données annualisées : cas/an et 100 000 habitants (population résidente selon Annuaire statistique de la Suisse). Les incidences annualisées permettent de comparer les différentes périodes.

<sup>b</sup> Voir surveillance de l'influenza dans le système de déclaration Sentinella

<sup>c</sup> N'inclut pas les cas de rubéole materno-fœtale.

<sup>d</sup> Femmes enceintes et nouveau-nés.

<sup>e</sup> Le nombre de cas de gonorrhée a augmenté en raison d'une adaptation de la définition de réinfection et n'est pas comparable à celui des éditions précédentes du Bulletin. Les déclarations pour le même patient arrivant à des intervalles d'au moins 4 semaines sont maintenant comptées comme cas séparés.

<sup>f</sup> Syphilis primaire, secondaire ou latente précoce.

<sup>g</sup> Les nombres de cas de syphilis ne sont plus comparables à ceux des éditions précédentes du Bulletin en raison d'une adaptation de la définition de cas.

<sup>h</sup> Inclus les cas de diphtérie cutanée et respiratoire, actuellement il y a seulement des cas de diphtérie cutanée.

### Maladies infectieuses: Situation à la fin de la 9<sup>e</sup> semaine (03.03.2020)<sup>a</sup>

	Semaine 9			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
<b>Transmission respiratoire</b>												
<b>Haemophilus influenzae: maladie invasive</b>		2	9	10	12	21	118	133	136	31	37	42
		1.20	5.40	1.50	1.80	3.20	1.40	1.60	1.60	2.10	2.50	2.80
<b>Infection à virus influenza, types et sous-types saisonniers<sup>b</sup></b>	1178	1445	1167	5495	6846	4276	12741	13786	11814	8821	9848	10048
	713.70	875.50	707.00	832.30	1036.90	647.70	148.40	160.60	137.60	593.80	662.90	676.40
<b>Légionellose</b>	1	7	12	21	39	28	545	589	508	54	90	68
	0.60	4.20	7.30	3.20	5.90	4.20	6.40	6.90	5.90	3.60	6.10	4.60
<b>Méningocoques: maladie invasive</b>	2			4	4	7	46	50	53	9	6	19
	1.20			0.60	0.60	1.10	0.50	0.60	0.60	0.60	0.40	1.30
<b>Pneumocoques: maladie invasive</b>	14	36	46	125	152	136	850	916	958	260	283	333
	8.50	21.80	27.90	18.90	23.00	20.60	9.90	10.70	11.20	17.50	19.00	22.40
<b>Rougeole</b>	4	13	2	7	44	7	191	91	74	24	55	12
	2.40	7.90	1.20	1.10	6.70	1.10	2.20	1.10	0.90	1.60	3.70	0.80
<b>Rubéole<sup>c</sup></b>						1	1	1	2			1
						0.20	0.01	0.01	0.02			0.07
<b>Rubéole, materno-fœtale<sup>d</sup></b>												
<b>Tuberculose</b>		4	10	30	33	52	417	494	527	64	75	91
		2.40	6.10	4.50	5.00	7.90	4.90	5.80	6.10	4.30	5.00	6.10
<b>Transmission féco-orale</b>												
<b>Campylobactériose</b>	34	88	104	233	335	347	7183	7750	7294	961	1084	1007
	20.60	53.30	63.00	35.30	50.70	52.60	83.70	90.30	85.00	64.70	73.00	67.80
<b>Hépatite A</b>	2			14	5	6	93	101	107	25	11	14
	1.20			2.10	0.80	0.90	1.10	1.20	1.20	1.70	0.70	0.90
<b>Hépatite E</b>	1	2	1	8	15	3	105	91	10	20	28	10
	0.60	1.20	0.60	1.20	2.30	0.40	1.20	1.10	0.10	1.40	1.90	0.70
<b>Infection à E. coli entérohémorragique</b>	18	19	12	51	52	49	1118	852	759	116	130	119
	10.90	11.50	7.30	7.70	7.90	7.40	13.00	9.90	8.80	7.80	8.80	8.00
<b>Listériose</b>		1	3	3	4	5	37	49	49	7	6	11
		0.60	1.80	0.40	0.60	0.80	0.40	0.60	0.60	0.50	0.40	0.70
<b>Salmonellose, S. typhi/paratyphi</b>				3		2	25	19	27	6	2	6
				0.40		0.30	0.30	0.20	0.30	0.40	0.10	0.40
<b>Salmonellose, autres</b>	5	17	29	63	64	86	1539	1444	1883	161	172	206
	3.00	10.30	17.60	9.50	9.70	13.00	17.90	16.80	21.90	10.80	11.60	13.90
<b>Shigellose</b>	3	4	2	8	18	10	202	264	142	24	38	23
	1.80	2.40	1.20	1.20	2.70	1.50	2.40	3.10	1.60	1.60	2.60	1.60

	Semaine 9			Dernières 4 semaines			Dernières 52 semaines			Depuis début année		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
<b>Transmission par du sang ou sexuelle</b>												
Chlamydieuse	132 80.00	251 152.10	186 112.70	930 140.90	992 150.20	820 124.20	12217 142.30	11437 133.20	11049 128.70	2155 145.10	2156 145.10	1868 125.80
Gonorrhée <sup>e</sup>	49 29.70	79 47.90	45 27.30	287 43.50	270 40.90	192 29.10	3972 46.30	3115 36.30	2577 30.00	706 47.50	652 43.90	474 31.90
Hépatite B, aiguë					2 0.30	1 0.20	25 0.30	34 0.40	39 0.40	3 0.20	6 0.40	6 0.40
Hépatite B, total déclarations	12	24	25	84	95	84	1069	1202	1201	187	216	218
Hépatite C, aiguë		2 1.20	2 1.20		4 0.60	5 0.80	20 0.20	29 0.30	37 0.40		7 0.50	7 0.50
Hépatite C, total déclarations	9	25	24	76	94	95	999	1243	1362	165	196	240
Infection à VIH		9 5.40	11 6.70	15 2.30	35 5.30	32 4.80	420 4.90	407 4.70	439 5.10	58 3.90	67 4.50	67 4.50
Sida			3 1.80	5 0.80		10 1.50	80 0.90	69 0.80	87 1.00	9 0.60	10 0.70	19 1.30
Syphilis, stades précoces <sup>f</sup>		10 6.10	5 3.00	20 3.00	65 9.80	31 4.70	627 7.30	653 7.60	68 0.80	79 5.30	124 8.40	68 4.60
Syphilis, total <sup>g</sup>	1 0.60	14 8.50	11 6.70	28 4.20	85 12.90	51 7.70	870 10.10	963 11.20	928 10.80	107 7.20	170 11.40	132 8.90
<b>Zoonoses et autres maladies transmises par des vecteurs</b>												
Brucellose							7 0.08	5 0.06	8 0.09			
Chikungunya					2 0.30		42 0.50	12 0.10	18 0.20	9 0.60	8 0.50	1 0.07
Dengue		2 1.20	3 1.80	1 0.20	10 1.50	12 1.80	248 2.90	177 2.10	161 1.90	33 2.20	38 2.60	32 2.20
Encéphalite à tiques							262 3.00	372 4.30	274 3.20	2 0.10	2 0.10	5 0.30
Fièvre du Nil occidental							1 0.01					
Fièvre jaune			1 0.60			1 0.20			1 0.01			1 0.07
Fièvre Q	1 0.60	2 1.20		6 0.90	3 0.40	3 0.40	100 1.20	57 0.70	39 0.40	8 0.50	10 0.70	6 0.40
Infection à Hantavirus								1 0.01	1 0.01			
Infection à virus Zika							1 0.01	2 0.02	14 0.20			1 0.07
Paludisme	1 0.60	9 5.40	4 2.40	17 2.60	28 4.20	17 2.60	295 3.40	291 3.40	333 3.90	54 3.60	45 3.00	47 3.20
Trichinellose							3 0.03		1 0.01	1 0.07		
Tularémie					2 0.30	2 0.30	147 1.70	116 1.40	137 1.60	7 0.50	6 0.40	11 0.70
<b>Autres déclarations</b>												
Botulisme									2 0.02			
Diphthérie <sup>h</sup>							2 0.02	5 0.06	2 0.02			
Maladie de Creutzfeldt-Jakob					3 0.40	2 0.30	16 0.20	20 0.20	20 0.20	3 0.20	4 0.30	3 0.20
Tétanos												

# Statistique Sentinella

Données provisoires

Sentinella:

Déclarations (N) des dernières 4 semaines jusqu'au 28.02.2020 et incidence pour 1000 consultations (N/10<sup>3</sup>)

Enquête facultative auprès de médecins praticiens (généralistes, internistes et pédiatres)

Semaine	6		7		8		9		Moyenne de 4 semaines	
	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>	N	N/10 <sup>3</sup>
Suspicion d'influenza	567	42.5	460	33.5	369	28.8	275	26.4	417.8	32.8
Oreillons	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0.3	0
Coqueluche	4	0.3	4	0.3	3	0.2	5	0.5	4	0.3
Piqûre de tiques	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0	0.8	0.1
Borréliose de Lyme	2	0.1	0	0	2	0.2	0	0	1	0.1
Herpès zoster	7	0.5	4	0.3	8	0.6	7	0.7	6.5	0.5
Néuralgies post-zostériennes	0	0	0	0	3	0.2	1	0.1	1	0.1
Médecins déclarants	151		155		152		139		149.3	

## VOICI COMMENT NOUS PROTÉGER:



✓ NOUVEAU



### Garder ses distances.

Par exemple:

- Protéger les personnes âgées en maintenant une distance suffisante.
- Garder ses distances dans les files d'attente.
- Garder ses distances lors de réunions.

### POUR RAPPEL:



Se laver soigneusement les mains.



Éviter les poignées de main.



Tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude.



En cas de fièvre ou de toux, rester à la maison.



Toujours téléphoner avant d'aller chez le médecin ou aux urgences.

[www.ofsp-coronavirus.ch](http://www.ofsp-coronavirus.ch)



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG  
Office fédéral de la santé publique OFSP  
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP  
Uffizi federal da sanadad publica UFSP



Scan for translation

# Rapport hebdomadaire des affections grippales

Sous nos latitudes, les affections grippales surviennent de façon saisonnière. Jusqu'à présent, une vague de grippe est observée chaque hiver. D'une année à l'autre, l'intensité, la durée, les souches virales et les répercussions sur la population varient. Afin d'informer la population et les médecins en temps voulu de la vague de la grippe et de la couverture de la grippe par le vaccin, l'OFSP publie d'octobre à avril un rapport hebdomadaire avec une évaluation des risques.

Le pic de la vague de grippe 2019/20 a été atteint en semaine 6/2020, avec une incidence de 329 consultations dues à une affection grippale pour 100 000 habitants. L'incidence diminue depuis la semaine 7.

## Semaine 9/2020

La propagation des affections grippales en Suisse est actuellement largement répandue. Durant la semaine 9, 139 médecins du système de surveillance Sentinella ont rapporté 26,4 cas d'affections grippales pour 1000 consultations. Extrapolé à l'ensemble de la population, ce taux correspond à une inci-

dence de 194 consultations dues à une affection grippale pour 100 000 habitants, avec une tendance à la baisse. Le seuil épidémique saisonnier de 69 cas d'affections grippales pour 100 000 habitants est dépassé depuis la semaine 2 (Figure 1).

Figure 1

Nombre de consultations hebdomadaires dues à une affection grippale, extrapolé pour 100 000 habitants







Figure 2

**Incidence des affections grippales pour 100 000 habitants et propagation des virus Influenza par région Sentinella durant la semaine 9/2020**



Région 1 (GE, NE, VD, VS), Région 2 (BE, FR, JU), Région 3 (AG, BL, BS, SO), Région 4 (LU, NW, OW, SZ, UR, ZG), Région 5 (AI, AR, GL, SG, SH, TG, ZH), Région 6 (GR, TI). Chiffre: incidence des affections grippales pour 100 000 habitants. Couleur: propagation (cf. glossaire).  
Tendance: ▲ ascendante ▼ descendante ◆ constante

L'incidence était la plus élevée dans la classe d'âge des 0 à 4 ans. La tendance était ascendante dans les classes d'âge des 15 à 64 ans. Pour toutes les autres classes d'âge, la tendance était descendante (Tableau 1). La propagation de la grippe était largement répandue dans toutes les régions, à l'exception de la région 2. La tendance était partout constante ou descendante, sauf dans la région 4 (Figure 2, Encadré).

Durant la semaine 9, le Centre National de Référence de l'Influenza (CNRI) a mis en évidence 11 virus Influenza A et 14 virus Influenza B dans les 55 échantillons analysés dans le cadre du système de surveillance Sentinella (Tableau 2).

Tableau 1:  
**Incidence des consultations dues à une affection grippale en fonction de l'âge durant la semaine 9/2020**

Classe d'âge	Consultations dues à une affection grippale pour 100 000 habitants	Tendance
0-4 ans	357	descendante
5-14 ans	287	descendante
15-29 ans	235	ascendante
30-64 ans	177	ascendante
≥65 ans	66	descendante
<b>Suisse</b>	<b>194</b>	<b>descendante</b>

Tableau 2:

**Virus Influenza circulant en Suisse**

Fréquence des types et sous-types d'Influenza isolés

	Semaines cumulées saison 2019/20	
	Fréquence des virus	Couverture par les vaccins
Echantillons positifs	433 de 884 (49 %)	100 % ▲ 100 % ■
B Victoria	33 %	100 % 100 %
B Yamagata	0 %	— #
B non sous-typé	3 %	
A(H3N2)	19 %	# #
A(H1N1)pdm09	41 %	100 % 100 %
A non sous-typé	4 %	

▲ Vaccin trivalent 2019/20

— Souche non couverte par le vaccin trivalent

■ Vaccin quadrivalent 2019/20

# La couverture par le vaccin n'est calculée qu'avec suffisamment de virus caractérisés.

Depuis le début de la saison de la grippe, le CNRI a mis en évidence par inhibition de l'hémagglutination les virus suivants dans des échantillons Sentinella :

Influenza A(H1N1)pdm09

– *Similaire à A/Michigan/45/2015*

– *Similaire à A/Brisbane/02/2018*

Influenza A(H3N2)

– *Similaire à A/Kansas/14/2017*

– *Similaire à A/Switzerland/8060/2017*

Influenza B-Victoria

– *Similaire à B/Colorado/06/2017*

Tous les virus caractérisés du sous-type A(H1N1)pdm09 et ceux de la lignée B-Victoria sont couverts par les vaccins trivalents et quadrivalents de cette saison (Tableau 2). Seuls quelques virus du sous-type A(H3N2) ont été caractérisés jusqu'à présent. Il n'est donc pas encore possible d'estimer la couverture des vaccins pour ce sous-type.

### Situation internationale

En Europe, on a généralement observé une activité grippale descendante. Presque tous les pays ont rapporté une activité basse à moyenne. [1]. L'Amérique du Nord a continué d'enregistrer une activité élevée [2-4]. En Asie, l'activité rapportée était basse à moyenne [4].

En Europe et en Asie, les virus Influenza en circulation appartenaient tant au sous-type A(H3N2) et A(H1N1)pdm09 qu'à la lignée B-Victoria [1, 4]. En Amérique du Nord, les virus de la lignée B-Victoria dominaient, suivis par le sous-type A(H1N1)pdm09, puis par A(H3N2) au Canada seulement.

### Contact

Office fédéral de la santé publique

Unité de direction Santé publique

Division Maladies transmissibles

Téléphone 058 463 87 06

E-mail [epi@bag.admin.ch](mailto:epi@bag.admin.ch)

### Pour les médias

Téléphone 058 462 95 05

E-mail [media@bag.admin.ch](mailto:media@bag.admin.ch)

### Références

1. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Seasonal Influenza – Latest surveillance data <http://flunewseurope.org/> (accessed on 03.03.2020).
2. Weekly U.S. Influenza Surveillance Report <http://www.cdc.gov/flu/weekly/index.htm> (accessed on 03.03.2020).
3. Canada Rapports hebdomadaires d'influenza. <http://www.canadiens-sante.gc.ca/diseases-conditions-maladies-affections/disease-maladie/flu-grippe/surveillance/fluwatch-reports-rapports-surveillance-influenza-fra.php> (accessed on 03.03.2020).
4. World Health Organisation (WHO) Influenza update – 362 [http://www.who.int/influenza/surveillance\\_monitoring/updates/latest\\_update\\_GIP\\_surveillance/en/](http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/) (accessed on 03.03.2020).

## Epidémie COVID-19 (nouveau coronavirus)

En décembre 2019, une épidémie de COVID-19, maladie jusqu'à présent inconnue chez l'homme, a été détectée pour la première fois dans la province de Hubei, en Chine. Un nombre croissant de pays déclarent continuellement de nouveaux cas.

Vous trouverez des informations sur la situation actuelle sur les sites Internet suivants:

### OFSP – pour les médecins :

<https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft.html>

Critères de suspicion et de déclaration, formulaires de déclaration

([www.bag.admin.ch/infreporting](http://www.bag.admin.ch/infreporting))

### OFSP – pour la population :

[www.ofsp-coronavirus.ch](http://www.ofsp-coronavirus.ch)

## La surveillance Sentinella de la grippe en Suisse

L'évaluation épidémiologique de la grippe saisonnière est basée :

- sur les déclarations hebdomadaires des affections grippales transmises par les médecins Sentinella ;
- sur les frottis nasopharyngés envoyés pour analyse au Centre National de Référence de l'Influenza (CNRI) à Genève ;
- sur tous les sous-types d'Influenza soumis à la déclaration obligatoire, confirmés par les laboratoires.

Les typages effectués par le CNRI en collaboration avec le système de déclaration Sentinella permettent une description en continu des virus grippaux circulant en Suisse.

Ce n'est que grâce à la précieuse collaboration des médecins Sentinella que la surveillance de la grippe en Suisse est possible. Elle est d'une grande utilité pour tous les autres médecins, de même que pour la population en Suisse. Nous tenons donc ici à exprimer nos plus vifs remerciements à tous les médecins Sentinella !

## GLOSSAIRE

- Incidence :** Nombre de consultations pour affections grippales pour 100 000 habitants par semaine.
- Intensité :** Comparaison de l'incidence actuelle avec l'incidence historique. L'intensité est fournie seulement pendant l'épidémie. Elle se subdivise en quatre catégories : basse, moyenne, élevée et très élevée.
- Propagation :** La propagation se base :
- sur la proportion des médecins Sentinella qui ont déclaré des cas d'affections grippales et
  - sur la mise en évidence de virus Influenza au CNRI dans les échantillons prélevés par les médecins Sentinella.
- Elle est classée dans les catégories suivantes : aucune, sporadique, répandue, largement répandue.
- Seuil épidémique :** Niveau de l'incidence à partir duquel la saison de la grippe se situe dans sa phase épidémique. Il est basé sur les données des dix saisons précédentes. Le seuil épidémique se situe à 69 cas d'affections grippales pour 100 000 habitants pour la saison 2019/20.
- Tendance :** Comparaison du niveau d'intensité de la semaine actuelle à celui des deux semaines précédentes. La tendance n'est fournie qu'après le dépassement du seuil épidémique et se subdivise en trois catégories : ascendante, descendante et constante.

*Et... action!*



1. Pénétration vaginale ou anale avec préservatif.
2. Et parce que chacun(e) l'aime à sa façon : faites sans tarder votre safer sex check personnel sur [lovelife.ch](http://lovelife.ch)

# Mesures de prévention et d'hygiène essentielles

Tant les personnes en bonne santé que les personnes atteintes de la grippe devraient suivre ces mesures de prévention et ces règles d'hygiène, qui permettent de réduire à la fois le risque de transmission et le risque d'infection.

**Lavez-vous les mains**

Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon plusieurs fois par jour.

**Toussez et éternuez dans le creux du coude**

Si vous n'avez pas de mouchoir en papier sur vous, tousez et éternuez dans le creux du coude. Ce geste est plus hygiénique que de mettre la main devant la bouche. Si vous deviez toutefois utiliser les mains, lavez-les soigneusement avec de l'eau et du savon le plus rapidement possible.

**Toussez et éternuez dans un mouchoir en papier**

Placez un mouchoir en papier devant la bouche et le nez pour tousser et éternuer. Après usage, jetez les mouchoirs en papier dans une poubelle et lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon.

**Restez à la maison**

Si vous souffrez de symptômes grippaux, restez impérativement à la maison. Vous éviterez ainsi la propagation de la maladie. Restez à la maison jusqu'à la guérison complète de votre grippe. Attendez au moins un jour après la disparition de la fièvre avant de retourner à vos occupations habituelles.

« Utiliser les antibiotiques  
avec parcimonie –  
pour qu'ils restent  
efficaces pour l'homme et  
l'animal. »





**LE DON D'ORGANES : PARLEZ-EN  
POUR LE BIEN DE VOS PROCHES**

**VIVRE-PARTAGER.CH**

**Parler au nom des autres, ce n'est pas facile.  
Je fais part de ma volonté à mes proches.  
Ils pourront ainsi prendre la décision appropriée.**



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

swiss  
transplant 

Département fédéral de l'intérieur DFI  
Office fédéral de la santé publique OFSP

OFSP-Bulletin  
OFCL, Diffusion publications  
CH-3003 Berne

P.P.

CH-3003 Bern  
Post CH AG

# OFSP-Bulletin

Semaine

# 11/2020