

Sondaggio fra la popolazione sul safer sex


Stato attuale delle conoscenze della popolazione svizzera sulle infezioni sessualmente trasmissibili (IST)



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra


Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

LOVE LIFE



Introduzione

Design dell'indagine, dati socio-demografici



Nel novembre 2023 il Consiglio federale ha adottato il programma nazionale «Stop all’HIV, ai virus dell’epatite B e dell’epatite C e alle infezioni sessualmente trasmesse» (NAPS). Secondo il programma entro il 2030 la Svizzera si prefigge di prevenire nuove trasmissioni dell’HIV e dei virus dell’epatite B e C nonché di ridurre l’incidenza delle altre infezioni sessualmente trasmissibili (IST).

La campagna LOVE LIFE è una delle misure del NAPS. È stata rilanciata il 25 aprile 2024 ed è incentrata su raccomandazioni di protezione e test personalizzate. Al fine di ottenere una base adeguata per valutare la situazione attuale in Svizzera, nel novembre 2023 è stata condotta, in collaborazione con DemoSCOPE, un’indagine sulle conoscenze della popolazione svizzera in materia di infezioni sessualmente trasmissibili.

Nell’ambito dell’indagine, nel novembre 2023 sono state condotte 1134 interviste. Sono state intervistate persone a partire dai 15 anni, residenti in Svizzera, parlanti una delle lingue nazionali e avvezze all’uso di Internet. I risultati sono stati ponderati moderatamente (età, sesso, regione linguistica) in base alle attuali cifre dell’Ufficio federale di statistica (UFS) per ottenere la reale distribuzione demografica.

Design dell'indagine

Indagine online ad hoc – Indagine sulle conoscenze della popolazione in Svizzera in materia di IST



Universo / Gruppo target

Popolazione residente in Svizzera di età superiore ai 15 anni, parlante una delle lingue nazionali e avveza all'uso di Internet

Dimensione del campione

1134 interviste differenziate per sesso ed età, ponderate in base all'attuale struttura demografica
Precisione di misurazione per $n = 1134$: +/- 2,9 %




Periodo dell'indagine

Da giovedì 9 novembre a venerdì 17 novembre 2023

Metodo di rilevazione


Indagine online (CAWI, ad hoc)
Base di indirizzi: pannello online DemoSCOPE e pannelli di organizzazioni partner



Dati socio-demografici

Lingua


Seleziona la tua lingua.



- Tedesco
- Francese
- Italiano

Identità di genere

Qual è la tua identità di genere?



- Cisgender
- Transgender

Sesso biologico


Indica il sesso che ti è stato assegnato alla nascita.



Base: 1134 persone intervistate

Età

Indica la tua età.




- 15-24 anni
- 25-34 anni
- 35-54 anni
- over 55

Base: 1134 persone intervistate

Tipo di insediamento

Indica il numero postale di avviamento a quattro cifre e il tuo luogo di residenza.




- Città
- Agglomerato
- Campagna

Livello di istruzione

Qual è l'ultima formazione che hai concluso?

FILTRO: tutti




Base: 1134 persone intervistate

Occupazione / Formazione

Qual è attualmente la tua situazione sul mercato del lavoro?

FILTRO: tutti



Base: 1134 persone intervistate

L'essenziale in breve

Dai risultati emerge quanto continui a essere importante la sensibilizzazione: quasi il 80 per cento degli intervistati ha saputo indicare l'HIV/Aids come infezione sessualmente trasmissibile, ma meno del 50 per cento ha menzionato la sifilide, la gonorrea, la clamidiosi, l'HPV o le epatiti virali.

Il preservativo è stato considerato il mezzo di protezione più importante (72 %). L'88 per cento degli intervistati sa che protegge in modo sicuro da un'infezione da HIV. Tuttavia, oltre la metà di essi ritiene erroneamente che sia altrettanto efficace contro la sifilide (72 %), la gonorrea (60 %), la clamidiosi (60 %), le epatiti virali (54 %) e l'HPV (51 %), ciò che invece non è vero: la protezione è infatti meno efficace per malattie quali sifilide, gonorrea e clamidiosi. Il safer sex check indica come proteggersi al meglio.

Il sondaggio evidenzia anche differenze fra le regioni linguistiche: circa il 60 per cento degli intervistati nella Svizzera tedesca e in Ticino ha già riflettuto sulla questione delle IST, contro il 41 per cento nella Svizzera francese. Anche l'importanza del tema varia da una regione all'altra: nella Svizzera francese soltanto il 25 per cento degli intervistati lo ritiene un tema «molto importante», a fronte del 34 per cento nella Svizzera tedesca e del 47 per cento in Ticino.


Temi della salute



Conoscenze in materia di IST

Quali infezioni sessualmente trasmissibili conosci? (Domanda aperta, sono possibili risposte multiple)

FILTRO: tutti




Base: 1134 persone intervistate

Approfondimento dell'argomento

Ti è già capitato di riflettere sulla questione delle «infezioni sessualmente trasmissibili (p. es. HIV, HPV, sifilide, gonorrea, clamidiosi, epatite A e B)»?

FILTRO: tutti




Base: 1134 persone intervistate

Approfondimento dell'argomento – per regione ed età

Ti è già capitato di riflettere sulla questione delle «infezioni sessualmente trasmissibili (p. es. HIV, HPV, sifilide, gonorrea, clamidiosi, epatite A e B)»?

FILTRO: tutti




Base: 1134 persone intervistate

Rilevanza dell'argomento IST

Quanto ritieni importante il tema delle «infezioni sessualmente trasmissibili (p. es. HIV, HPV, sifilide, gonorrea, clamidiosi, epatite A e B)»?

FILTRO: tutti




Base: 1134 persone intervistate

Rilevanza dell'argomento IST – per regione

Quanto ritieni importante il tema delle «infezioni sessualmente trasmissibili (p. es. HIV, HPV, sifilide, gonorrea, clamidiosi, epatite A e B)»?

FILTRO: tutti




Numero di persone intervistate fra parentesi

Stato delle conoscenze della popolazione svizzera sulle infezioni sessualmente trasmissibili (IST)

Rilevanza dell'argomento – Informazione da parte della Confederazione

Quanto ritieni importante che l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) svolga campagne di informazione sul tema delle infezioni sessualmente trasmissibili (p. es. con manifesti, annunci online, opuscoli informativi)?

FILTRO: tutti




Base: 1134 persone intervistate

Salute sessuale

Bisogno d'informazione

Come valuti le tue conoscenze sulle infezioni sessualmente trasmissibili?

FILTRO: tutti




Base: 1134 persone intervistate

Fonti d'informazione

Sai dove puoi trovare informazioni in caso di domande sulle infezioni sessualmente trasmissibili?

FILTRO: tutti




Base: 1134 persone intervistate

Conoscenze sui centri di consulenza

Dove cercheresti informazioni o aiuto in caso di domande sulle infezioni sessualmente trasmissibili e sui mezzi per proteggerti? (Sono possibili risposte multiple)

FILTRO: tutti




Base: 1134 persone intervistate

*questa domanda è stata posta solo alle donne

Conoscenze sui centri di consulenza – per età

Dove cercheresti informazioni o aiuto in caso di domande sulle infezioni sessualmente trasmissibili e sui mezzi per proteggerti? (Sono possibili risposte multiple)

FILTRO: tutti




Numero di persone intervistate fra parentesi

*questa domanda è stata posta solo alle donne

Informazioni sulle IST

Hai già chiesto informazioni sulle infezioni sessualmente trasmissibili e sui mezzi per proteggerti?

FILTRO: tutti




Base: 1134 persone intervistate

Informazioni sulle IST – per regione, età, sesso



Hai già chiesto informazioni sulle infezioni sessualmente trasmissibili e sui mezzi per proteggerti?

FILTRO: tutti




Numero di persone intervistate fra parentesi

Stato delle conoscenze della popolazione svizzera sulle infezioni sessualmente trasmissibili (IST)

Contatto a rischio senza informazione

Hai già avuto l'impressione di aver contratto un'infezione sessualmente trasmissibile, ma poi non hai fatto più nulla (p. es. non hai cercato informazioni o non hai chiesto consulenza in merito)?

FILTRO: tutti




Base: 1134 persone intervistate

Nessuna informazione sulle IST – Motivi

Perché non hai chiesto informazioni sulle infezioni sessualmente trasmissibili e su dove puoi rivolgerti per una consulenza? (Sono possibili risposte multiple)

FILTRO: La persona non si è mai informata sulle IST o non ha fatto nulla pur pensando di avere contratto una IST




Base: 398 persone intervistate

Nessuna informazione sulle IST – per sesso

D8.3: Perché non hai chiesto informazioni sulle infezioni sessualmente trasmissibili e su dove puoi rivolgerti per una consulenza? (Sono possibili risposte multiple)

FILTRO: La persona non si è mai informata sulle IST e su come proteggersi o non ha fatto nulla pur pensando di avere contratto una IST




Numero di persone intervistate fra parentesi

Nessuna informazione sulle IST – per età

Perché non hai chiesto informazioni sulle infezioni sessualmente trasmissibili e su dove puoi rivolgerti per una consulenza? (Sono possibili risposte multiple)

FILTRO: La persona non si è mai informata sulle IST o non ha fatto nulla pur pensando di avere contratto una IST




Numero di persone intervistate fra parentesi

*Base inferiore a 30

Persone che ritengono che le IST non le concernono – Motivi

Perché pensi che le IST non ti concernono? (Domanda aperta, sono possibili risposte multiple)

FILTRO: La persona dice che le IST non la concernono



Base: 263 persone intervistate

Informazioni sulle IST – Motivi

**Perché hai chiesto informazioni sulle infezioni sessualmente trasmissibili e sui mezzi per proteggersi?
(Sono possibili risposte multiple)**

FILTRO: La persona si è informata almeno una volta sulle IST e su come proteggersi




Base: 737 persone intervistate

Infezione sessualmente trasmissibile – Norme di comportamento

Ipotizziamo che una persona nella tua cerchia di amici sospetti di avere contratto un'infezione sessualmente trasmissibile. Cosa le consiglieresti? (Sono possibili risposte multiple)

FILTRO: tutti




Base: 1134 persone intervistate

Conoscenze sulle misure di protezione

Sai come proteggerti e proteggere altre persone dalle infezioni sessualmente trasmissibili?
(Domanda aperta, sono possibili risposte multiple)

FILTRO: tutti




Base: 1134 persone intervistate

Conoscenze sulle misure di protezione – Età 1/2

Sai come proteggerti e proteggere altre persone dalle infezioni sessualmente trasmissibili?
(Domanda aperta, sono possibili risposte multiple)

FILTRO: tutti




Numero di persone intervistate fra parentesi

Conoscenze sulle misure di protezione – Età 2/2

Wissen Sie, wie Sie sich selbst und andere Personen vor sexuell übertragbaren Infektionen schützen können? (Offene Frage, Mehrfachantworten möglich)


FILTRO: tutti



Uso del preservativo per proteggersi dalle IST

Da quali infezioni sessualmente trasmissibili pensi che ti possa proteggere il preservativo?
(Sono possibili risposte multiple)

FILTRO: tutti




Base: 1134 persone intervistate

Uso del preservativo per proteggersi dalle IST – per età

Da quali infezioni sessualmente trasmissibili pensi che ti possa proteggere il preservativo?
(Sono possibili risposte multiple)


FILTRO: tutti



Numero di persone intervistate fra parentesi

■ 15-24 anni (138) ■ 25-34 anni (183) ■ 35-54 anni (377) ■ Over 55 (436)


Comportamento sessuale



Attività sessuale

Hai avuto rapporti sessuali negli ultimi 12 mesi?

FILTRO: Età >= 16




Base: 1134 persone intervistate

Fattori di rischio I

Ripensando agli ultimi 12 mesi, quale delle seguenti affermazioni corrisponde al tuo caso?

FILTRO: Ho avuto rapporti sessuali negli ultimi 12 mesi




Base: 774 persone intervistate

Fattori di rischio II

Con che frequenza...

FILTRO: Ripensando agli ultimi 12 mesi, quale delle seguenti affermazioni corrisponde al tuo caso?

Ai punti 1), 2), 5), 6), 7) o 8) è stato risposto affermativamente almeno una volta; vengono interrogati i predetti punti



■ Più volte alla settimana
 ■ Una volta alla settimana
 ■ Più volte al mese
 ■ Una volta al mese
 ■ Più volte all'anno
 ■ Una volta all'anno
 ■ Più raramente
 ■ Mai, oppure non più


Numero di persone intervistate fra parentesi

*Base inferiore a 30

Tipo di relazione

Sei attualmente in una relazione? (Sono possibili risposte multiple)

FILTRO: Ho già fatto sesso una volta




Base: 1038 persone intervistate

Numero di partner sessuali

Con quante persone hai avuto rapporti sessuali negli ultimi 12 mesi?

FILTRO: Ho avuto rapporti sessuali negli ultimi 12 mesi




Base: 774 persone intervistate

Tipo di contatti sessuali

Ripensando agli ultimi 12 mesi, in quali delle seguenti situazioni hai fatto esperienze sessuali?
(Sono possibili risposte multiple)

FILTRO: Ho avuto rapporti sessuali negli ultimi 12 mesi




Base: 774 persone intervistate

Le IST quale tema di conversazione

Hai parlato con il tuo partner sessuale attuale o precedente delle infezioni sessualmente trasmissibili e delle misure di protezione?

FILTRO: Ho già fatto sesso una volta




Base: 1038 persone intervistate

Le IST non sono tema di conversazione

Perché sinora non hai parlato con nessun partner sessuale delle infezioni sessualmente trasmissibili o delle misure di protezione? (Sono possibili risposte multiple)

FILTRO: Non parla mai con il partner sessuale delle IST e delle opzioni di proteggersi




Base: 305 persone intervistate

Le IST come tema di conversazione – Motivi

Per quale motivo hai parlato con uno o più partner sessuali della protezione dalle infezioni sessualmente trasmissibili? (Sono possibili risposte multiple)

FILTRO: Parla almeno talvolta con il partner sessuale delle IST e delle misure di protezione




Base: 621 persone intervistate

Protezione dalle IST



Quali misure hai impiegato per proteggerti dalle infezioni sessualmente trasmissibili negli ultimi 12 mesi?
(Sono possibili risposte multiple)

FILTRO: Ho avuto rapporti sessuali negli ultimi 12 mesi




Base: 774 persone intervistate

Rinuncia all'uso del preservativo

Perché non usi il preservativo? (Sono possibili risposte multiple)

Base: 494 persone intervistate




Base: 494 persone intervistate

Orientamento sessuale

Ti consideri...

FILTRO: Età >= 16



Base: 1134 persone intervistate

Allestimento del sondaggio, valutazione e testo

Demo SCOPE AG
Klusenstrasse 17
6043 Adligenswil
☎ +41 41 375 40 00

DemoSCOPE Fribourg AG
Route Sainte-Thérèse 2E
1700 Fribourg

☎ +41 26 555 05 00

✉ demoscope@demoscope.ch

Realizzazione

Ufficio federale della sanità pubblica

Committente

Per conto della campagna LOVE LIFE 2024

V.240423

LOVE LIFE

www.lovelife.ch